

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 20-12-65 449 400

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE CHAMPAGNE (Tél. 47-22-87)

(AISNE, ARDENNES, AUBE, HAUTE-MARNE, MARNE, MEUSE)

ABONNEMENT ANNUEL

15 F

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 5, place Paul-Jamot - REIMS.
C. C. P. : CHALONS-SUR-MARNE 2.802-15

BULLETIN N° 63 de Décembre 1965

17 décembre 1965

ETAT SANITAIRE DU VIGNOBLE EN 1965

Mildiou :

Les conditions climatiques de l'année (forte pluviométrie et basses températures) n'ont pas permis un développement important de la maladie. La première tache a été observée à Grauves (Marne) le 26 mai, d'autres ont fait leur apparition courant juin en divers points (Trépail, Chouilly, Verzenay). Néanmoins il faut attendre les derniers jours de juillet pour observer une sortie importante, n'intéressant d'ailleurs que les repousses, grappes et feuillage adulte étant convenablement protégés par les traitements appliqués antérieurement. En définitive, malgré les précipitations abondantes et répétées, l'année 1965 n'a pas été une "année à mildiou".

Oïdium : Ce champignon reste toujours aussi rare en Champagne. Seules quelques parcelles négligées ont eu à en souffrir. Partout ailleurs les soufres mouillables apportés en mélange avec les bouillies antimildiou ont évité tout dommage.

Pourriture grise :

Les conditions climatiques de l'année ont contribué à une apparition précoce de cette maladie. Dès fin mai, on observait quelques taches sur feuilles et en août la maladie s'attaquait aux grappes et même aux sarments. Fort heureusement, l'automne sec n'a pas permis une extension de la maladie à la veille des vendanges comme cela avait été le cas en 1963. Il n'en reste pas moins que des pertes non négligeables de récolte sont imputables à ce champignon.

Rougeot : Les attaques de ce cryptogame, localisées dans l'espace, ont été parfois assez virulentes. Elles ont été observées en particulier dans la vallée de Marne et dans le Barsequanais.

F.1.1.4 1

Excoriose : Ne semble pas avoir progressé sensiblement au cours de cette campagne, son importance reste toujours très limitée dans le vignoble champenois.

Acariose : Les foyers d'acariose sont en extension par rapport à 1963 et surtout 1964. Dans certains cas, ils ont été mal contrôlés, en particulier dans les jeunes plantations de certains vignobles périphériques. Partout ailleurs l'application systématique des traitements acaricides d'été a permis de conserver la situation bien en main.

Araignées rouges :

D'assez nombreux foyers ont été signalés durant la deuxième décade de mai. Des traitements spécifiques ont enrayé leur développement. Ceux appliqués début août laissent espérer que ce parasite sera moins virulent en 1966.

Erinose : S'est manifestée en particulier dans les blancs mais a été aisément freinée par l'application de produits soufrés.

Pyrale : Se rencontre dans l'ensemble du vignoble champenois. Cette année bien que les foyers aient été peu virulents plusieurs traitements ont souvent dû être effectués en raison de l'échelonnement des sorties, accentué par les conditions atmosphériques.

Vers de la grappe (Cochylis-Eudemis)

En raison des conditions météorologiques, on n'a pas observé d'Eudemis. Le premier vol de Cochylis, échelonné sur mai et juin a été très faible. Le deuxième, en juillet, a été lui aussi très réduit, d'autant plus que bon nombre d'oeufs ont été détruits par des traitements systématiques visant d'autres parasites. En définitive, hormis dans quelques communes de l'Aube, les dégâts imputables aux vers de la grappe ont été négligeables.

Cochenilles :

Les cochenilles ont fait preuve d'assez peu d'activité. Néanmoins, dans les foyers habituels, des traitements ont dû être appliqués en juillet.

En définitive, l'année 1965 qui, de par les conditions météorologiques qui ont régné jusqu'à l'automne, semblait devoir être particulièrement mauvaise s'est avérée relativement satisfaisante. Les maladies cryptogamiques, à priori redoutables, n'ont causé que des dommages restreints, grâce en particulier au temps exceptionnellement sec pour la saison qui a régné durant tout le mois d'octobre. En ce qui concerne les parasites animaux, la saison a été assez défavorable à leur développement si bien que l'année 1965 se classera à cet égard parmi les années moyennes.

Les Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles,

l'Inspecteur de la Circonscription
Phytosanitaire de REIMS

Imprimerie de la Station de CHAMPAGNE - Directeur-Gérant : L. BOUYX.